

Назначение препаратов и материалов в аптечке

Активированный уголь – таблетки по 0,5г принимают внутрь в виде взвеси в воде. При скоплении газов в кишечнике по 1-2г 3-4 раза в день; при отравлениях до 20г на прием (40 таблеток).

Анальгин – обезболивающее при травмах, головных, суставных и других болях, а также при почечной колике по 1-2 таблетке.

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) – при болях в суставах, жаропонижающее: по 1-2 шт. Нельзя применять при язве желудка.

Баралгин – тоже как анальгин.

Бинты и лейкопластырь – для наложения повязок.

Бриллиантовый зеленый («зеленка») – обеззараживающее средство для смазывания неглубоких ран, порезов, царапин, гнойничков, заболеваний кожи.

Валидол – средство при психических перегрузках, болях в области сердца: 1 таблетку (капсулу) или 4-5 капель на кусочек сахара под язык до полного рассасывания.

Валокардин – как Настойки валерианы, пустырника.

Димедрол – антиаллергические препараты, а также в сочетании с обезболивающими препаратами для усиления эффекта. После принятия нельзя управлять транспортными средствами, так как вызывает сонливость.

Жгут кровоостанавливающий – для остановки кровотечений и при синдроме длительного сдавливания.

Йод – антисептическое средство при воспалительных процессах кожи и мышц для смазывания мелких гнойничков, ссадин, порезов и ранок, для обработки краев раны перед наложением повязки.

Карвалол - как Настойки валерианы, пустырника.

Либексин – таблетки для подавления кашлевого рефлекса при повреждениях грудной клетки, переломах ребер.

Настойки валерианы, пустырника, – успокоительное и слабое снотворное при повышенной раздражительности, бессоннице, неврозах; для снятия эмоционального напряжения и возбуждения при стрессах, испуге: по 25-30 капель на стакан воды.

Нашатырный спирт – средство для выведения из обморочного состояния и стимуляции дыхания: ватный тампон, смоченный раствором, подносят к носу несколько раз или растирают виски.

Но-шпа – спазмолитическое средство (снимает спазмы) в таблетках и ампулах – снимает боль внутренних органов.

Перекись водорода – кровоостанавливающее обеззараживающее средство.

Пермарганат калия («марганцовка») – применяют 0,1 – 0,01%-й раствор для полоскания полости рта, горла и промывания желудка; 0,1,-0,5%-й раствор – для промывания ран; 2-5%-й раствор для обработки язвенных и ожоговых поверхностей.

Сода двууглекислая (пищевая) – используется в виде 2%-ного раствора для промывания глаз и кожи при попадании фосфорорганических соединений, а

также для снятия зуда после укуса насекомых и для полоскания горла при фарингитах и ангине.

Сульгин – как Фуразолидон.

Супрастин – как Димедрол.

Тавегил - как Димедрол.

Фталазол - как Фуразолидон.

Фуразолидон – средства при расстройствах желудка.

Фуралицин – для полоскания горла: 2 таблетки на стакан кипятка, раствор применять после остывания.